



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 075188       |
| <b>Prix HT</b>          | 92,61 €      |
| <b>Prix TTC</b>         | 112,06 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

*VEUILLEZ TOUJOURS FOURNIR LES DIMENSIONS CI-DESSOUS, POUR UNE DÉTERMINATION CORRECTE DE LA TAILLE, SVP*

- Circonférence de la cheville
- Circonférence à la hauteur de la partie la plus épaisse du veau
- Circonférence au creux du genou
- La longueur du sol au creux du genou
- Les chaussettes à bout ouvert ou fermé sont
- Couleur désirée

VenoTrain<sup>®</sup> Micro - Le bas de compression à la mode pour se sentir bien dans VenoTrain<sup>®</sup> Micro se compose d'un tricot doux avec une grande proportion de microfibres. En plus d'un aspect attrayant, ce bas de compression garantit un excellent confort de port. L'effet de microconfort fait en sorte que la peau n'entre en contact qu'avec des microfibres.

- Pour prévenir les varices
- Avec une semelle confortable
- Dans l'habillement et le sur-mesure

## Bon pour la marche

Avec VenoTrain<sup>®</sup> Micro, le grand confort de port commence au pied: la semelle confort est antibactérienne et donc résistante aux odeurs. Des zones de soulagement spéciales au niveau du talon et de la pointe du pied et des zones d'étirement élastique au milieu de la plante stabilisent le pied. Ils sont invisiblement incorporés dans la forme anatomique de la zone du pied.

## Thérapie de compression avec système

Le choix des bas de contention thérapeutiques ou des collants que les patients reçoivent dépend principalement de la gravité de leur état. La liste ci-dessous donne un aperçu des conditions dans lesquelles les bas de compression Venotrain<sup>®</sup> peuvent être utilisés et vous offre une aide optimale dans le choix d'un produit approprié de la gamme Venotrain<sup>®</sup>.

- Pour prévenir les troubles veineux
- En cas de varicose légère
- Après des opérations sur les veines
- Après la sclérothérapie
- Pendant la grossesse et les voyages
- Pour le traitement de la varicose grave
- En cas d'insuffisance veineuse grave
- Après la guérison d'un ulcère du cruris venosum
- Pour les troubles lymphologiques
- En éléphantiasis pour la prévention, le traitement et le suivi d'un ulcère du cruris venosum